



ข้อแนะนำเกษตรกรรายย่อย

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร **ASF**

- 1** งดซื้อ หรือนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่
ถ้ามีสุกรขุนโตพอที่จะขายได้ให้รับขาย
- 2** ห้ามรถ และบุคคลภายนอกเข้า-ออกฟาร์ม รวมถึง
จิตยารักษาสุกร เกษตรกรต้องฝึกจิตยาเอง
- 3** ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรที่ป่วยหรือตาย
ผิดพลาดโดยเด็ดขาด
- 4** มีระบบฆ่าเชื้อสำหรับบุคคลและพาหนะ
ที่เข้า - ออกฟาร์ม รถขนอาหารสุกร/
รถขนสุกร ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วพักไว้
1-2 ชั่วโมง ก่อนนำเข้าคอกสุกร



17 ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร



ข้อแนะนำเกษตรกรรายย่อย

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร **ASF**

- 5** ห้ามนำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร เนื่องจากมีความ
เสี่ยงที่จะมีเชื้อจากเศษเนื้อหรือเลือดสุกรปนเปื้อน
มาด้วย หากนำมาให้สัตว์กินต้องต้มด้วย
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
- 6** ป้องกันสัตว์พาหะ เช่น สุนัข นก หมู ที่อาจ
คาบเศษเนื้อสุกรป่วย เข้ามากินภายในฟาร์ม
หรือแมลงวันก็สามารถแพร่กระจาย
เชื้อโรคได้



17 ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร



ข้อแนะนำเกษตรกรรายย่อย

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

7 งดการผสมพันธุ์สุกร ทั้งการใช้พ่อพันธุ์ผสม หรือการผสมเทียม

8 งดซื้อเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรมาบริโภค ควรรับประทานโปรตีนอื่นแทน เช่น ไข่ ไก่ เป็ด โค แพะ แกะ ปลา และอาหารทะเล



9 สุกรที่จะจำหน่าย ต้องขนย้ายออกมา นอกเล้าสุกร เพื่อลดโอกาสในการรับเชื้อ

10 เปลี่ยนรองเท้า ล้างมือก่อนเข้าไปเล้าสุกร



ข้อแนะนำเกษตรกรรายย่อย

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

11 ไม่เลี้ยงสุกรปะปนกับหมูป่า เนื่องจากหมูป่า เป็นแหล่งรังโรคระบาดในสุกร

12 มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำลายเชื้อโรค อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง



13 หากพบสุกรป่วย/ตายผิดปกติ ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันที ห้ามฆ่าแหละ/ขาย/บริโภค





ข้อแนะนำร้านขายอาหารสัตว์

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร **ASF**

1 ติดตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรับ-ส่งอาหาร

2 มีถาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับจุ่มเท้าก่อนเข้าร้าน



3 ติดตั้งเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ แบบพกพา บนรถขนส่งอาหารสัตว์



4 ดูแลสุขภาพลักษณะของพนักงาน



"ช่วยกันระวัง ป้องกันภัยจากโรคระบาดในสุกร"

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ☎ 044-812334 ต่อ 13, 044-811828 ✉ pvlb_cpm@dld.go.th

งานเผยแพร่ข้อมูล
สำนักงานปศุสัตว์สุพรรณบุรี



ข้อแนะนำผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร **ASF**

1

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแหล่งที่มาของสัตว์ตามกฎหมาย ที่คอกพักสัตว์

2

ตรวจสอบสุขภาพสุกรในคอกพักสัตว์ ก่อนเข้าโรงฆ่า หากพบสุกรที่ป่วยตามนิยามของโรค ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

3

ตรวจซาก/เนื้อสัตว์ ที่ผ่านการชำแหละแล้ว

4

ไม่นำสัตว์ป่วยตายผิดปกติเข้าโรงฆ่าสัตว์

5

ติดตั้งเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้า-ออกโรงฆ่าสัตว์

6

ใช้โซดาไฟ 2% ชำเชื้อในท่อระบายน้ำ

7

หลังการฆ่าสัตว์ นำมิด เขียง อุปกรณ์ต่างๆ ผ่ากันเปื้อนแช่น้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่มกลูตารัลดีไฮด์ 1:200 แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดตากแห้ง เพื่อใช้ในวันถัดไป รวมทั้งให้พ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณโรงพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ทั้งไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนล้างด้วยน้ำสะอาด



"ยึดกฎนี้ร่วมใจ ป้องกันภัยจากโรคระบาดในสุกร"

ข้อเสนอแนะนำร้านขายเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์/รถเร่

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF



นายแพทย์สุรเกียรติ์
สุวรรณกุล นายสัตวแพทย์

1

รับเนื้อสุกร หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ
มีการรับรองแหล่งที่มา

2

มีการพ่นทำลายเชื้อโรคยานพาหนะ
ขนส่งเป็นประจำ

3

ไม่รับเนื้อสุกรที่ป่วยมาขาย

4

หลังการจำหน่ายเนื้อสัตว์ นำอุปกรณ์ต่างๆ
เช่น มีด เขียง ผ้ากันเปื้อน แขน้ำยาฆ่าเชื้อ
กลุ่มกลูตารัลดีไฮด์ 1:200 แล้วล้างด้วย
น้ำสะอาด ตากให้แห้ง เพื่อใช้ในวันถัดไป
รวมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโต๊ะ ตู้แช่
ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนล้างด้วย
น้ำสะอาด

"ชัยภูมิร่วมใจ ป้องกันภัยจากโรคระบาดในสุกร"

